

# AYT MATEMATİK

SORU BANKASI

ÖSYM  
TARZINA  
**%100**  
UYUMLU

Özgür Balcı

ORİJİNAL

- Aşağıdaki Hologramı Kazıyınız.
- 3D Mobil Uygulamasında Karekodu Okutunuz.
- Kitap Orijinal mi Kontrol Ediniz.
- Korsansa Orijinal Baskısı Ücretsiz Gönderilecektir.
- Aşağıda Hologram Yoksa Kitabı Aldığınız Yere İade Ediniz.



Eyüp B. ve  
Matematiğin Fatih'i'nden



DETAYLI  
VİDEO  
ÇÖZÜMLÜ



*Bu ürünün bütün hakları 3D YAYINLARI'na aittir.*

*Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin  
önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik  
herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltıması, yayımılanması ve  
depolanması yasaktır.*

**Kapak**

3D Yayınları Grafik Birimi

**Dizgi**

3D Yayınları Dizgi Birimi

**Baskı Tarihi**

2024

**Baskı**

Başak Matbaacılık

Sertifika No: 51529

**Baskı Adresi**

Çınar Mahallesi Çankırı Bulvarı No: 108

Akyurt /ANKARA



**3 D Yayınları**

Fatih Sultan Mh. 2720 Sk. No: 4/B High Life Office Etimesgut/ANKARA

**Tel : 444 0 407**



3dyayinlari



@3Dyayinlari

## Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler

Son açıklanan yeni sınav sistemi YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı)'de bilindiği üzere Matematik dersinin ağırlığı artırılmış ve soruların mevcut MEB müfredatından sorulacağı açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu müfredat içerisinde "günlük hayat problemleri ile ilişkilendirilir" kazanımından yola çıkarak içerisinde çok sayıda günlük hayat problemi (Yeni nesil) soru bulunduran 3D AYT Matematik kitabını sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Bu gereksinimleri karşılamak amacıyla son derece özgün, yeni nesil sorulardan oluşturduğum bu kitabın sizleri hedefinize ulaştıracına olan inancım sonsuzdur.

Bu kitabın oluşumunda;

- Bir bölüme ait çok sayıda alt başlık oluşturularak hazırlanan testlerle konu içerikleri eksiksiz hazırlanmıştır.
- Bir test içerisindeki sorular kolaydan zora 3D teknigue uygun olarak hazırlanmıştır.
- Her testin soruları genelden özele bilgi düzeyinizi artırmak üzere tasarlanmıştır.
- Özgün ve hedefe uygun sorular kullanılmıştır.
- ÖSYM soruları titizlikle analiz edilerek her bölüme ait bire bir ÖSYM testleri hazırlanmıştır.
- TÜMEVARIM testleriyle öğrencilerin konuyu geriye doğru dinamik bir şekilde taraması sağlanmıştır.

Elinizdeki kitap, bir parçası olmaktan gurur duyduğum **"3D Yayınları"** ekibinin emeği ve özverisi ile yazılmıştır. Bu güzel kitabın siz değerli gençlerimizle buluşmasına olanak sağlayan Genel Müdür Yardımcımız **Hasan KOCA**'ya, çözüm odaklı anlayışıyla ekibimize güç veren Yayın Yönetmenimiz **Emre ERDOĞAN**'a, sonsuz sabrı ve titiz çalışmalarıyla kitabıma önemli katkıları olan Sürek Yönetmenimiz **İlke Özlem ÜNALAN**'a, olağanüstü güzel görseller ortaya çıkan dizgicimiz **Hilal KÖSE**'ye ve desteklerini esirgemeyen değerli meslektaşlarım **Fatih DAYI**, **Fatih KAZOVA**, **Yücel ASLANEROĞLU**, **Arafat TERZİ**, **Volkan NAS** ve **Seydi VARLIOĞLU** hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Üniversiteye giriş sınavında ve hayatın her alanında başarı ve mutluluk dileklerimle...

**Bu kitabın oluşumundaki zorlu süreçte benden desteklerini esirgemeyen kitabın asıl sahibi  
ve emektarları olan haklarını asla ödeyemeyeceğim eşim ve kızıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.**


**Özgür BALCI**

FESTTU.COM

# 1 BOYUT

# 3 Düzey Testleri


3 Düzey konu testlerinde sorular zorluk derecelerine göre sınıflandırılmıştır. İlk 3 soru kolay, son 3 soru zor, diğer sorular ise orta seviye olarak belirlenmiştir. Bu sayede öğrencilerin her konuda farklı zorluklarda ve tarzlarda soruya karşılaşması sağlanmıştır.



# 2 BOYUT

# BİRE BİR ÖSYM Testleri


ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki birikimleri göz önüne alınarak hazırlanan bire bir ÖSYM testleri ile konu sonlarında öğrencinin o konuyu bütünsel bir bakış açısıyla taraması sağlanmıştır.



# 3D BOYUT

# Tümevarım Testleri

Ünite aralarında konuyu geriye doğru tümevarım teknigiyle tarayan genel tarama testleri ile öğrencilerin son ana kadar tüm konuları dinamik bir şekilde hatırlaması amaçlanmıştır.



FESTTU.COM



- 1** **3D Mobil** uygulamasını telefon veya tabletine indir.
- 2** **Testler** üzerindeki karekodu okut.
- 3** Dilediğin **fenomeni** seç.
- 4** Tüm soruların **video çözümlerini** izle.

Ayrıca video çözümlerimize  
**3dyayinlari.com**  adresinden veya  
**3D Yayınları Youtube**  kanalından  
ulaşabilirsiniz.



## İÇİNDEKİLER

### 01. BÖLÜM: POLİNOMLAR

Polinomlar.....	9
Bire Bir ÖSYM .....	21

### 02. BÖLÜM: II. DERECEDEN DENKLEMLER

II. Dereceden Denklemler.....	23
Bire Bir ÖSYM .....	37

### 03. BÖLÜM: II. DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

II. Dereceden Fonksiyonların Grafikleri .....	39
Bire Bir ÖSYM .....	51

### 04. BÖLÜM: DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri .....	53
Bire Bir ÖSYM .....	65
TÜMEVARIM - I .....	67

### 05. BÖLÜM: FONKSİYONLAR

Fonksiyonlar .....	85
Bire Bir ÖSYM .....	95

### 06. BÖLÜM: TRİGONOMETRİ

Trigonometri .....	97
Bire Bir ÖSYM .....	127

### 07. BÖLÜM: LOGARİTMA

Logaritma.....	129
Bire Bir ÖSYM .....	145
TÜMEVARIM - II .....	147

### 08. BÖLÜM: DİZİLER

Diziler.....	163
Bire Bir ÖSYM .....	179

### 09. BÖLÜM: LİMİT VE SÜREKLİLİK

Limit ve Sürekliklilik.....	181
Bire Bir ÖSYM .....	195

### 10. BÖLÜM: TÜREV

Türev .....	199
Bire Bir ÖSYM .....	233

### 11. BÖLÜM: İNTEGRAL

İntegral.....	241
Bire Bir ÖSYM .....	267

### 12. BÖLÜM: SAYMA VE OLASILIK

Sayma ve Olasılık.....	271
Bire Bir ÖSYM .....	281
TÜMEVARIM - III .....	283



1. I.  $P(x) = x^3 - 1$   
 II.  $R(x) = \sqrt{x} - 3x + 1$   
 III.  $M(x) = \frac{2}{3}x^2 - \sqrt{3}x$

ifadelerinden hangileri polinomdur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız III      C) I ve III  
 D) I ve II      E) I, II ve III

2.  $P(x - 1) = 2x^2 + 3x + 1$

olduğuna göre,  $P(1)$  kaçtır?

- A) 15      B) 16      C) 17      D) 18      E) 19

3.  $\text{der}(P(x)) = 2$

$$\text{der}(R(x)) = 1$$

olduğuna göre,

- I.  $\text{der}(P(x) \cdot R(x)) = 3$   
 II.  $\text{der}(P^2(x)) = 4$   
 III.  $\text{der}(R(x^2)) = 2$

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II  
 D) I ve III      E) I, II ve III

4.  $P(x) = (a^3 - 8)x^2 + (a - 2b)x + c - a - b$


ifadesi sıfır polinomu olduğuna göre,

$$a \cdot b \cdot c$$

çarpımının sonucu kaçtır?

- A) 4      B) 6      C) 8      D) 9      E) 12

5. Alanı  $(x^2 + 7x + 10) \text{ br}^2$  olan bir dikdörtgen aşağıdaki gibi 4 dikdörtgen bölgeye ayrılmıştır.




Mavi bölgelerin toplam alanı  $R(x)$  polinomuyla gösterildiğine göre,  $R(x + 3)$  polinomu nedir?

- A)  $2x + 6$       B)  $4x + 12$       C)  $5x + 15$   
 D)  $7x + 12$       E)  $7x + 21$

6. Anıl, matematik öğretmeninin verdiği 4 soruluk polinom ödevini çözemediğinden internette bulduğu polinom çözme telefon uygulamasıyla ödevini yapmıştır.

Anıl, sorunun uygulama ile fotosunu çekmiş ve soruların cevapları mavi renk yazı ile altlarına yazılmıştır.



Öğretmeni doğru cevapladığı her soru için 5 puan vermektedir.

Buna göre Anıl, hata yapabilen bu programı kullandığında kaç puan alır?

- A) 0      B) 5      C) 10      D) 15      E) 20

7.  $P(x) = x^{n-4} + x^{10-n} + x$

ifadesi bir polinom olduğuna göre, n kaç farklı değer alabilir?


- A) 6      B) 7      C) 8      D) 9      E) 10

8. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçek katsayılı bir  $P(x)$  polinomunun kökleri  $P(0)$  ve  $P(2)$  değerleridir.

Buna göre,  $P(2)$ 'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A)  $\frac{1}{2}$       B)  $\frac{3}{2}$       C)  $\frac{5}{2}$   
D)  $\frac{7}{3}$       E) 2

9. Bir sınıf etkinliğinde duvarda asılı birinci dereceden polinomlardan ikisi seçili çarpılarak ikinci dereceden başkatsayıısı 1 olan polinomlar oluşturulacaktır.



Buna göre, oluşturulacak polinomların  $x + 5$  ile bölümünden kalan en fazla kaçtır?

- A) 84      B) 80      C) 75      D) 72      E) 60

10

10. Bir  $P(x)$  polinomunun  $x^2 - 9$  ile bölümünden kalan  $2x + 3$ 'tür.

Buna göre,

$$(x + 4) \cdot P(x - 1)$$

polinomunun  $x + 2$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) -15      B) -12      C) -10      D) -9      E) -6

11.  $P(x) = (a - 2)x^2 + (b - 2)x + a + b$


ifadesi sabit polinom olduğuna göre,

$$P(1), P(2) \text{ ve } P(3)$$

sayılarının geometrik ortalaması kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

12. A noktasından havalandanaya başlayan uçakın  $x$  saniye sonra yatayda aldığı yol metre cinsinden  $P(x)$  polinomu, dikeyde aldığı yol metre cinsinden  $R(x)$  polinomuyla belirleniyor.



$$R(x - 1) = 4x + 3$$

$$P(x + 1) = x^2 + 6x + 8$$

olduğuna göre, uçakın dikeyde aldığı yol 19 metre olduğunda yatayda kaç metre yol alır?

- A) 20      B) 21      C) 23      D) 24      E) 25



1. a ve b tam sayılar olmak üzere her x gerçek sayısı için,

$$12x^2 - x - 6 = (3x + a) \cdot (4x - b)$$

olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

2.  $P(x) = (a + 3)x^3 + (b - 2)x + 4$

$$R(x) = 4x^3 + (c - 3)x^2 + d - 1$$


polinomları veriliyor.

$$P(x) = R(x)$$


olduğuna göre, a · b · c · d çarpımı kaçtır?

- A) 20      B) 24      C) 28      D) 30      E) 36

- 3.



Yukarıda bir kenar uzunluğu x br olan mavi küp, boyutları x, x ve 3 br olan mor kare dik prizma ve boyutları 2, 3 ve x olan yeşil dikdörtgenler prizmasının 9 tanesi kullanılarak aşağıdaki cisim oluşturuluyor.



Oluşan cismin hacmi P(x) polinomuyla gösterildiğine göre, P(x + 1) polinomunun x - 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 72      B) 84      C) 90      D) 96      E) 108

4. Bir P(x) polinomu için,

$$P(3x + 2) = x^2 + ax + 4$$

olarak veriliyor.

$P(x + 1)$  polinomunun x - 4 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre, a kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

5. P(x) ve R(x) birer polinom olmak üzere,

$$P^3(x) \cdot R(x^2)$$


$$\frac{P(x+1)}{R(x)}$$

polinomlarının dereceleri sırasıyla 40 ve 10'dur.

Buna göre, der(P(x)) + der(R(x)) toplamının sonucu kaçtır?

- A) 13      B) 14      C) 15      D) 16      E) 17

6. Çevre uzunluğu P(x) polinomuyla belirlenen aşağıda verilen dikdörtgen, işaretli çizgiler boyunca kesilerek boyalı bölge oluşturuluyor.



Oluşan yeni bölgenin çevre uzunluğu R(x) polinomuyla veriliyor.

$$P(x - 1) = x^3 + 2x^2 + x + 1$$

olduğuna göre, R(x + 1) polinomunun sabit terimi kaçtır?

- A) 19      B) 20      C) 21      D) 22      E) 23

7.  $P(x)$  ve  $Q(x)$  birer polinom olmak üzere,

$$\frac{P(x+3)}{Q(x-1)} - x = 2$$

olarak veriliyor.

$P(x+4)$  polinomunun katsayılar toplamı 20 olduğuna göre,  $Q(3x+1)$  polinomunun sabit terimi kaçtır?

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

8.  $a$  bir gerçek sayı olmak üzere,


$$P(x) = (x-2) \cdot (x-3) \cdot (x-4) \cdot (x-5)$$

polinomu veriliyor.

$P(x-2)$  polinomu  $x-a$  ile tam bölündüğünde göre,  $a$ 'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 15      B) 17      C) 20      D) 22      E) 23

9. Aşağıda farklı kalınlıkta verilen iki halattan ince halatın uzunluğu 24 cm, kalın halatın uzunluğu 30 cm'dir.



İnce ve kalın halatlar bir uçlarından yakıldıkları ( $t=0$ ) andan  $t$  anına kadar yanmış kısımının boyları cm cinsinden veren polinomlar sırasıyla  $P(t)$  ve  $R(t)$  dir.

$$P(t) = t^2 + 2t$$

$$R(t) = 4t$$

olduğuna göre, ince halat tamamen yanlığı anda kalın ipin yanmayan kısmının uzunluğu kaç cm olur?

- A) 18      B) 16      C) 14      D) 12      E) 10

10.  $P(x) = x^3 - 2mx + 4$

polinomunun çarpanlarından biri  $x-2$ 'dir.

$$R(x) = mx^2 - nx + 4$$

polinomunun katsayılar toplamı 6'dır.

Buna göre,

$$P(x-4) \cdot R(x-2)$$

polinomunun  $x-m-n$  ile bölümünden kalan kaçtır?


- A) 48      B) 50      C) 52      D) 56      E) 60

11.  $P(x) = x^6 - 13x^5 - 13x^4 - 13x^3 - 15x^2 + 15x + 20$

polinomunun  $x-14$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 18      B) 24      C) 32      D) 34      E) 36

12. Saat yönünde dönen üç çark ile tasarlanmış bir polinom çarkında turuncu çark dakikada  $90^\circ$ , yeşil çark dakikada  $135^\circ$  ve mor çark dakikada  $45^\circ$  dönmektedir.



Çarkların dönmesi ile polinomlar elde edilmektedir.

Örneğin; çarkların bu konumu ile  $P(x) = x^2 + 2x + 3$  polinomu elde edilmektedir.

Buna göre, yukarıdaki çarkın hareketinden 17 dakika sonra oluşan polinomun  $2x-4$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 32      B) 30      C) 28      D) 24      E) 20



1.  $P(x) = (x - 1)^3 + (x + 1)^2$

polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı kaçtır?

- A) -1    B) -2    C) -3    D) -4    E) -5

2.  $P(x) = \frac{3x + m}{6x + 4}$


ifadesi sabit polinom olduğuna göre,

$m \cdot P(3)$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A)  $\frac{1}{2}$     B) 1    C)  $\frac{3}{2}$     D) 2    E) 3

3.  $P(x)$  ve  $R(x)$  birer polinom olmak üzere,



işlemi tanımlanıyor.

$$\begin{array}{c} \text{P(x)} \\ \times \\ \text{x} - 1 \end{array} = 5$$

$$\begin{array}{c} \text{P(x)} \\ \times \\ \text{x} - 2 \end{array} = 8$$

olduğuna göre,

$$\begin{array}{c} \text{P(x+1)} \cdot \text{P}(2x-1) \\ \times \\ \text{x} - 1 \end{array}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 15    B) 20    C) 30    D) 40    E) 50

4.  $P(x)$  ve  $Q(x)$  polinomları için

$$\frac{P(x+3)}{Q(x+3)} = 2x + 5$$

olarak veriliyor.

$P(x)$  polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre,  $Q(x + 1)$  polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 6


5.  $P(x)$  bir polinom,  $m$  gerçel sayıdır.

$$(x - 2) \cdot P(x + 2) = x^2 - mx + m$$

olduğuna göre,  $P(x + 1)$  polinomunun  $x - m$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 4    B) 3    C) 2    D) 1    E) 0

6. Aşağıda verilen sistemde okların çıktığı çember içerisindeki polinoma okun üzerindeki işlem uygulanıyor ve çıkan sonuç okun gösterdiği çember içeresine yazılıyor.



Buna göre,

$$P(x) = 2(x^2 - 9) \cdot (x^2 + x - 2)$$

polinomu için mavi bölümdeki sayı kaçtır?

- A) 10    B) 12    C) 14    D) 16    E) 18

7.  $P(x)$  ve  $R(x)$  birer polinom olmak üzere,  $(PoR)(x)$  ifadesine  $P$  bileşke  $R$  denir.  $P(R(x))$  biçiminde gösterilebilir.

$$P(x) = x^3 - 8x - 10$$

$$R(x) = x^3 - 2x$$


olduğuna göre,

$$(PoR)(x)$$

polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 20      B) 22      C) 24      D) 26      E) 28


8. Aşağıda üçüncü dereceden  $P(x) = y$  polinom fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir.



Buna göre,  $P(2x + 6)$  polinomunun katsayılar toplamı ile  $P(3x - 7)$  polinomunun sabit teriminin toplamı kaçtır?

- A) -11      B) -10      C) -9      D) -8      E) -7

9. Alanı  $(x^3 + 3x^2 + 2x + m)$  birim kare olan bir zemin boyutları  $(x - 1)$  ve  $(1)$  birim olan



fayanslar kullanılarak döşenecektir.

Buna göre,  $m$  aşağıdakilerden hangisi olursa zemin hiç boşluk kalmayacak biçimde döşenebilir?

- A) -3      B) -4      C) -5      D) -6      E) -7

10.  $P(x)$  bir polinom,  $m$  ve  $n$  birer gerçek sayıdır.

$$P(x^3) = (m + n)x^6 + (m - 2)x^5 + (m - n)x^4 + mx^3 + 1$$

olduğuna göre,  $P(x)$  polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

11.  $P(x) = (x - 2)^2 \cdot (x + 3)$

$$R(x) = (x - 2) \cdot (x + 1) \cdot (x + 3)$$

olmak üzere,

$$Q(x) = EBOB(P(x), R(x))$$

olarak tanımlanıyor.


Buna göre,  $Q(x)$  polinomuyla ilgili olarak,

- I.  $x - 1$  ile tam bölünemez.  
II. Katsayılar toplamı -1'dir.  
III. Sabit terimi -6'dır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız III      C) I ve II  
D) I ve III      E) II ve III

12. Sarı, beyaz, yeşil, mavi ve mor renkler ile oluşturulmuş



5 bölmeli lambada bir  $P(x)$  polinomu lamba üzerinde yazan polinom ile tam bölünüyorsa lamba yanıyor, tam bölünemiyorsa lamba yanmıyor.

$P(x)$  polinomu için yeşil, mavi ve mor lambalar yanıp diğer lambalar yanmadığına göre,  $P(x - 2)$  polinomu için hangi lambalar kesinlikle yanar?

- A) Sarı, beyaz, mavi      B) Mavi, mor, sarı  
C) Beyaz, yeşil, mavi      D) Sarı, beyaz, yeşil  
E) Sarı, yeşil, mor



1.  $P(x)$  ve  $R(x)$  polinomları

$$P(x) = x^3 - x + 2$$

$$R(x) = x^2 - 2x + 3$$

olarak veriliyor.

Buna göre,

$$P(x - 2) + R(x - 1)$$

polinomunun  $x - 3$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 6      B) 5      C) 4      D) 3      E) 2

2.  $P(x) = x^3 - 2x - 4$

polinomu için,

- I. Çarpanlarından biri  $x - 2$ 'dir.
- II.  $x - 1$  ile bölümünden kalan  $-5$ 'tir.
- III.  $P(x - 1)$  polinomunun sabit terimi  $3$ 'tür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II  
D) II ve III      E) I, II ve III

3.  $P(x) = x^2 - 2x + m$

polinomunun  $x - 3$  polinomuyla bölümünden kalan ile  $x - 1$  polinomuyla bölümünden kalanın aritmetik ortalaması  $3$ 'tür.

Buna göre,  $m$  kaçtır?

- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

4.  $P(Q(x))$  polinomunun  $Q(x)$  polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm  $Q(x) + 2$  ve kalan  $3$ 'tür.

Buna göre,  $P(x^2 + 1)$  polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) 6      B) 9      C) 11      D) 16      E) 20


5.  $P(x)$ , başkatsayısı  $2$  olan birinci dereceden polinomdur.

$$P(x) + P(2x + 1) = P(3x + 4)$$

olduğuna göre,  $P(0)$  kaçtır?

- A) 2      B) 4      C) 6      D) 8      E) 10

6. Matematik öğretmeni Neziha ile Öğrencisi Medine arasında geçen Whatsapp mesajlaşması aşağıda verilmiştir.



Buna göre, Neziha Öğretmen  $x$ 'in katsayısını doğru olarak kaç bulmuştur?

- A) 1      B) 3      C) 4      D) 5      E) 7

7.  $P(x) = 6x^3 + 2x^{4-m} + x^{2m-8} + m$

polinomu veriliyor.

Buna göre,

$$P(x+1) - P(x-1)$$

polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 56      B) 48      C) 45      D) 40      E) 36

8.  $P(x)$  polinomunun  $(x-1) \cdot (x-2) \cdot (x-3)$  ile bölümünden elde edilen kalan  $x+1$ 'dir.

Buna göre,

$$P(P(P(x)))$$


polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

9.  $a$  bir gerçek sayı olmak üzere aşağıda uzunluğu  $(x^4 + x^2 + x - a)$  birim olan bir tahta verilmiştir.



Bu tahta, uzunluğu  $(x - 2)$  birim olan



16

birimindeki tahta parçalarına ayrıldığında hiç tahta artmamaktadır.

Tahtanın ucundan bir miktar kesildiğinde uzunluğu  $x + 3$  birim olan tahta parçalarına hiç artmayacak biçimde ayrılabilmektedir.

Buna göre, kesilen kısmın uzunluğu kaç birim olabilir?

- A) 50      B) 55      C) 60      D) 65      E) 70

10.  $P(x)$  bir polinom olmak üzere,

$$P(x) = P(1) \cdot x^2 - 2P(1) \cdot x + 6$$

olarak veriliyor.

Buna göre,  $P(x+1)$  polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) 4      B) 6      C) 8      D) 10      E) 12

11.  $P(x) = [(x^3 + 1)^2 + x]^2$

olmak üzere,

$$P(x) \cdot Q(x^2)$$


polinomunun derecesi 30 olduğuna göre,

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

polinomunun derecesi kaçtır?

- A) 2      B) 3      C) 4      D) 6      E) 8

12. Şekilde 5 tane eş yeşil kare ve 2 tane eş sarı dikdörtgen gösterilmiştir.



Bir yeşil karenin çevre uzunluğu bir sarı dikdörtgenin çevre uzunluğundan 6 cm daha azdır.

Karenin bir kenar uzunluğu  $x$  cm olmak üzere şeklin alanı  $P(x)$  polinomuyla gösteriliyor.

Buna göre,  $P(x+1)$  polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 72      B) 75      C) 81      D) 84      E) 90



1.  $P(x)$  sabit,  $R(x)$  sıfır polinomdur.

$$P(x) + P(2) = P(3) + 4$$

olduğuna göre,

I.  $P(1) \cdot P(4) = 16$

II.  $P(2) \cdot R(3) = 0$

III.  $P(1) + R(3) = 8$

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II  
D) I ve III      E) I, II ve III

2.  $n$  pozitif tam sayı ve  $a$  tam sayı olmak üzere,

$$P_n(x) = x^n + nx^2 + a$$

polinomu tanımlanıyor.

$$P_4(x) + x^2 \cdot P_3(x)$$

polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden kalan 52 olduğuna göre,

$$P_2(x - 2)$$

polinomunun sıfırlarının kareleri toplamı kaçtır?

- A) 8      B) 10      C) 13      D) 16      E) 26

3.  $P(x) = (a - 3) \cdot \sqrt{x} + (b - 3)x^{-2} + ax + b$

İfadesi bir polinom olduğuna göre,

$$P(x - 1)$$

polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $x + 4$       B)  $2x + 2$       C)  $2x + 4$   
D)  $3x + 3$       E)  $3x$

4. Başkatsayı 4 olan üçüncü dereceden bir  $P(x)$  polinomuyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- Çarpanlarından biri  $x^2 - 2x + 3$ 'tür.
- $x - 3$  ile tam bölünebilmektedir.

Buna göre,  $P(x)$  polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

- A) -20      B) -18      C) -16      D) -12      E) -8


5. Sıfırlarından biri derecesine eşit olan polinomlara **derece polinom** denir.

Başkatsayı 1 olan  $P(x)$  derece polinomunun sıfırlarının kümesi  $\{2, 4, 5\}$ 'tir.

$P(x)$  polinomunun tüm sıfırlarının toplamı 16 olduğuna göre,  $P(x + 2)$  polinomunun  $x - 4$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 2      B) 4      C) 6      D) 8      E) 10

6. Aşağıda verilen polinom makinesinde girdi kısmından bir değer makineye atıldığından sarı veya mavi bölgeden dışarı çıkmaktadır.



Girdi kısmına giren  $x$  sayısı sarı bölmenden  $P(P(x))$ , mavi bölmenden  $P(x + 3)$  olarak çıkmaktadır.

$P(x)$  başkatsayı 2 olan birinci dereceden bir polinom, ve  $x = n$  girdi sayısı için sarı bölmenden çıkan sayı 7, mavi bölmenden çıkan sayı 8 olduğuna göre,  $P(x)$  polinomunun sabit terimi kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

7.  $b$  bir gerçek sayı olmak üzere

$$P(x) = (x - 1) \cdot (x - 2) \cdot (x - 3) \cdot (x + b + 1)$$

polinomu veriliyor.

$P(x - 1)$  polinomunun  $x - a$  ile bölümünden kalanı sıfır yapan a gerçel sayılarının toplamı 16 dır.

Buna göre,  $P(x + 2)$  polinomu aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

- A)  $x^2 + x$       B)  $x^2 - x$       C)  $x^2 - 5x + 4$   
 D)  $x^2 - 4x - 5$       E)  $x^2 - 3x - 4$

8.  $P(x)$  bir polinom olmak üzere,  $P(a) < 0$  eşitsizliğini sağlayan a doğal sayılarına bu polinomun negatifleri denir.

$$P(x) = 2x - 1$$

$$R(x) = 3x - 15$$

polinomları veriliyor.

Buna göre,

$$R(P(x))$$

polinomunun kaç farklı negatif vardır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

9. Bir matematik öğretmeni sınıfında polinom bulmacası oyunu oynatıyor. Oyunda öğretmen sınıfa iki polinomu tanıtıyor ve ders sonunda iki polinomla ilgili soru soruyor.

**P(x) polinomu:** Başkatsayıısı 3, sabit terimi 2, katsayılar toplamı 10 olan ikinci dereceden polinomdur.

**R(x) polinomu:** Başkatsayıısı 2 olan,  $x - 2$  ve  $x - 4$  ile bölündüğünde her defasında 6 kalani veren ikinci dereceden polinomdur.

**Öğretmenin sorusu:**  $P(2x) + x \cdot R(x)$  polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalan kaçtır?

Buna göre, bu sorunun doğru cevabı kaçtır?

- A) 48      B) 42      C) 36      D) 32      E) 24

10.  $P(x)$  ve  $R(x)$  birer polinom olmak üzere,

$$x^2 \cdot P(x + 1) = (x + 1) \cdot R(x)$$

olarak veriliyor.

$$\text{der}(P(x) \cdot R(x)) = 13$$

olduğuna göre,  $P(R(x))$  polinomunun derecesi kaçtır?

- A) 48      B) 45      C) 42      D) 35      E) 24

11.  $P(x)$  ve  $R(x)$  birer polinom olmak üzere  $R(x) | P(x)$  gösterimi,  $R(x)$  polinomunun  $P(x)$  polinomunu tam böldüğünü ifade eder.

- $(x - 2) | P(x)$
- $(x - 3) | P(x)$
- $(x + 2) | P(x)$
- $P(x + 3)$  polinomunun  $x^3$  polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm 2'dir.

Buna göre,  $P(x + 1)$  üçüncü dereceden polinomunun sabit terimi kaçtır?

- A) 24      B) 20      C) 18      D) 15      E) 12

12.  $P(x)$  bir polinom olmak üzere  $y = P(x)$  ifadesine polinom fonksiyon denir. Bu polinom fonksiyonda  $y = P(x)$  ise  $P^{-1}(y) = x$  olur.

- $\text{der}(P(x)) = 2$
- $P^{-1}(0) = 2$
- $P^{-1}(0) = 3$
- $P(1) = 6$

Buna göre,  $P(x)$  polinomunun  $x - 4$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 4      B) 6      C) 8      D) 10      E) 12

13.  $P(x)$  ve  $R(x)$  polinomlarının katsayıları birer tam sayıdır.  $P(x)$ , sıfırı  $-\frac{3}{5}$  olan birinci dereceden polinomdur.

$$P(x) \cdot R(x)$$

katsayıları sıfırdan farklı rakamlar olan ikinci dereceden polinom olduğuna göre,  $R(x)$  polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden kalan kaç olabilir?

- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7



1.  $P(x)$  birinci dereceden polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden kalan,  $x - 1$  ile bölümünden kalanın 3 katına eşittir.  $P(x - 1)$  polinomunun  $x + 3$  ile bölümünden kalan 3'tür.

**Buna göre,**

- I.  $P(-1)$
- II.  $P(3)$
- III.  $P(-7)$

**İfadelerinden hangileri birer tam sayıdır?**

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II  
D) I ve III      E) I, II ve III

2.  $n$  ve  $m$  bir gerçek sayılar olmak üzere,

$$P(x - 2) = x^2 + mx + 4 + n$$

$$R(x + 1) = x^2 - 4x + m - 7$$

polinomları veriliyor.

**$(x + 1)$  polinomu  $P(x)$  ve  $R(x)$  polinomlarının ortak çarpanı olduğuna göre,  $n$  kaçtır?**

- A) -1      B) 0      C) 1      D) 2      E) 3

3.  $P(x)$  polinomunun katsayılar toplamı 12'dir.

**Buna göre,**

$$[P(x^2) + 1]^2$$

**polinomunun çift dereceli katsayılar toplamı kaçtır?**

- A) 98      B) 102      C) 144      D) 169      E) 196

4.  $P(x)$  bir polinom olmak üzere,

$$P(P(x)) = (m - 2)x^5 + mx + 2$$

olarak veriliyor.

**Buna göre,**

$$P(P(P(P(x))))$$

**polinomunun  $x - 3$  ile bölümünden kalan kaçtır?**

- A) 16      B) 18      C) 20      D) 22      E) 24

5.  $P(x) = x^2 + mx + 6$

polinomunun  $x - 2$  ile bölümünden elde edilen bölüm  $R(x)$ , kalan 22'dir.

**Buna göre,  $R(x + 2)$  polinomunun  $x + 1$  ile bölümünden kalan kaçtır?**

- A) 2      B) 4      C) 6      D) 8      E) 9

6.  $a$  ve  $b$  gerçek sayılar olmak üzere,

$$P(x) = x^3 - 2x^2 + bx + 2$$

polinomunun  $x - a$  ile bölümünden kalan  $(a - 2)x + a$ 'dır.

**Buna göre,  $b$  kaçtır?**

- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

7. Bir  $P(x)$  polinomunda

- $P(1) = 7$
- $P(-2) = 1$

**olduğuna göre,  $P(x)$  polinomunun  $x - 3$  ile bölümünden elde edilen bölüm  $m$  sabit sayısı olduğuna göre,  $m$  kaçtır?**

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

8.  $P(x)$  katsayıları pozitif tam sayılar olan birinci dereceden polinomdur.

$$P^2(3) - P^2(2) = 13$$

**olduğuna göre,  $P(5)$  kaçtır?**

- A) 8      B) 9      C) 10      D) 11      E) 12

9.  $P(x) = x^3 - ax + 2$

polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalan A,  $x + 1$  ile bölümünden kalan B'dir.

$$|A - B| = A - B$$

olduğuna göre, a'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

10.  $P(x)$  ve  $R(x)$  birer polinom olmak üzere,

$$\text{der}\left(\frac{P(x)}{R(x)}\right) = 2$$

olarak veriliyor.

$P^3(x)$  polinomunun derecesi,  $R(x^4)$  polinomunun derecesinden büyük olduğuna göre,  $P^2(x)$  polinomunun derecesi en fazla kaçtır?

- A) 4      B) 8      C) 10      D) 12      E) 14

11. Başkatsayı 1 ve kökleri  $\{2, 3, 4\}$  kümesinin elemanı olan ikinci dereceden  $P(x)$  polinomu için,

$$P(2) \cdot P(3) = 0$$

$$P(4) \cdot P(3) = 0$$

olduğuna göre,  $P(x)$  polinomunun sabit teriminin alabileceğini değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 30      B) 32      C) 35      D) 36      E) 40

12.  $P(x)$  ve  $h(x)$  birer polinom olmak üzere,

- $\text{der}(h(x)) < 2$
- $\text{der}(h(x) \cdot P(x) \cdot P(x+3)) = 4$

olarak veriliyor.

Buna göre,

$$\frac{h(1) + h(2) + h(3)}{h(4)}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A)  $\frac{1}{2}$       B) 1      C)  $\frac{3}{2}$       D) 2      E) 3

13.  $P(x)$ ,  $R(x)$  ve  $B(x)$  dereceleri birbirinden farklı olan birer polinom olmak üzere,

$$\frac{P(x)}{R(x)} \text{ ve } \frac{R(x)}{B(x)}$$

birer polinomdur.

Buna göre,

I.  $\frac{P(x)}{B(x)}$  bir polinomdur.

II.  $\text{der}\left(\frac{P(x)}{B(x)}\right) \geq 2$

III.  $B(1) = 0$  ise  $P(1) = 0$ 'dır.

İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II  
D) I ve III      E) I, II ve III

14.  $K(x)$ ,  $R(x)$ ,  $Q(x)$  ve  $P(x)$  birer polinom olmak üzere,

$$\frac{P(2x)}{K(x)} \longdiv{P(x)}_8$$

$$\frac{Q(2x)}{R(x)} \longdiv{Q(x)}_{32}$$

olduğuna göre,  $\text{der}(P^2(x) \cdot Q(x^3))$  kaçtır?

- A) 15      B) 16      C) 18      D) 21      E) 24

15.  $P(x)$  ve  $Q(x)$  birer polinom olmak üzere,

- $\text{der}(P(x) + Q(x)) = 1$
- $\text{der}(Q(x)) = 2$

olarak veriliyor.

- $Q(x)$  polinomunun başkatsayıısı 1,
- $P(x)$  polinomunun tek dereceli teriminin katsayıısı 3,
- $P(2) = 0$

olduğuna göre,  $P(-2)$  kaçtır?

- A) -12      B) -6      C) 1      D) 6      E) 12



1.  $P(x) = 4x^3 - mx^2 + 2$

olmak üzere,  $P(x - 1)$  polinomunun katsayılar toplamı ile  $P(x - 2)$  polinomunun  $x - 3$  ile bölümünden kalan birbirine eşittir.

Buna göre, m kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

2.  $P(x)$  ve  $R(x)$  polinomları

$$P(x) = x + (x + 1) + (x + 2) + \dots + (x + 11)$$

$$R(x) = (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + \dots + (x + 6)$$

olarak veriliyor.

Buna göre  $P(x)$  polinomunun  $R(x)$  polinomu ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 10      B) 16      C) 18      D) 24      E) 26

3.  $P(x)$  bir polinom olmak üzere  $P(a) = 0$  eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir.

$P(x)$  ve  $R(x)$  polinomları için,

$$P(x) = x^2 - 9$$

$$R(x) = P(P(x))$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre,

I. 3

II.  $2\sqrt{3}$

III.  $-\sqrt{6}$

sayılarından hangileri  $R(x)$  polinomunun köküdür?

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III  
D) II ve III      E) I ve II

4. Başkatsayısı 2 olan ikinci dereceden bir  $P(x)$  polinomu için,

$$P(3) - P(1) = 22$$

olduğuna göre,  $P(2) - P(1)$  değeri kaçtır?

- A) 9      B) 10      C) 11      D) 12      E) 13

5. Başkatsayısı 2 olan üçüncü dereceden  $P(x)$  polinomu,  $x^2 + 9$  ile kalansız bölünebilmektedir.

$P(3x)$  polinomunun  $3x - 2$  ile bölümünden elde edilen kalan 65'dir.

Buna göre,  $P(1)$  değeri kaçtır?

- A) 16      B) 24      C) 28      D) 30      E) 36

6. Gerçek katsayılı  $P(x)$ ,  $R(x)$  ve  $M(x)$  polinomları veriliyor.

Katsayılar toplamı sıfırdan farklı olan  $P(x)$  polinomu için,

$$P(x) = R(x) \cdot M(x + 2)$$

eşitliği sağlanıyor.

$P(x)$  polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalan,  $R(x)$  polinomunun  $x - 1$  ile bölümünden kalanın 2 katıdır.

Buna göre,  $M(x - 1)$  polinomunun  $x - 4$  ile bölümünden kalan kaçtır?

- A)  $\frac{2}{3}$       B)  $\frac{1}{4}$       C)  $\frac{3}{4}$       D) 1      E) 2

7. a ve b tam sayı olmak üzere,

$$P(x) = x^3 - 5ax^2 + (3b - 2)x - 3b$$

$$R(x) = x^2 - 2ax + b$$

polinomları için,

- $P(3) = 0$
- $R(3) \neq 0$

olduğu biliniyor.

$R(x)$  polinomunun kökleri aynı zamanda  $P(x)$  polinomunun da kökleri olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

- A) 3      B) 4      C) 5      D) 6      E) 7

8. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere,

$$P(x) = (x + m) \cdot (x + n)$$

polinomu veriliyor.

$P(x - 2)$  polinomunun  $x - 4$  ile bölümünden kalan 15'tir.

Buna göre, m . n çarpımı kaçtır?

- A) 3      B) 4      C) 6      D) 8      E) 10

9.  $P(x)$  bir polinom olmak üzere,

$$P(x-1) + x^2 \cdot P(x+1) = x^3 + 3x^2 + x + 1$$

eşitliği veriliyor.

$$P(3) = 5$$

olduğuna göre,  $P(x)$  polinomunun katsayıları toplamı kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

10.  $P(x) = x^2 - 6x + a$

$$R(x) = x^2 + 2x + b$$

polinomları veriliyor.

- Bu iki polinom ortak bir köke sahiptir.
- $P(x)$  polinomunun kökleri eşittir.

Buna göre,  $a + b$  toplamı kaçtır?

- A) -6      B) -5      C) -4      D) -3      E) -2

11. Üçüncü dereceden gerçek katsayılı  $P(x)$  polinomunun kökleri  $-3, -2$  ve  $4$ 'tür.

$$P(0) = 48$$

olduğuna göre,  $x^3$  lü terimin katsayısı kaçtır?

- A) -4      B) -3      C) -2      D) 2      E) 3

22

12. Üçüncü dereceden başkatsayısı 1 olan gerçek katsayılı  $P(x)$  polinomu,

$$P(1) = P(2) = P(3) = 5$$

eşitliklerini sağlıyor.

Buna göre,  $P(0)$  değeri kaçtır?

- A) -1      B) 0      C) 1      D) 2      E) 3

13.  $P(x)$  ve  $Q(x)$  sabit olmayan birer polinom,  $R(x)$  ise birinci dereceden bir polinom olmak üzere,

$$P(x) = Q(x) \cdot R(x)$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre;

- I.  $P(x)$  ve  $R(x)$  polinomlarının sabit terimleri aynıdır.
- II.  $P(x)$ 'in grafiği bir parabol ise  $Q(x)$ 'in grafiği bir doğrudur.
- III.  $Q(x)$  polinomunun her kökü  $P(x)$  polinomunun da bir köküdür.

İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız II      B) Yalnız III      C) I ve II  
D) I ve III      E) II ve III

14. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan üçüncü dereceden gerçek katsayılı  $P(x)$  ve  $R(x)$  polinomları için 2 ve 6 ortak köklerdir.  $P(x) - R(x)$  polinomu  $x - 1$  ile bölündüğünde kalan 15 olmaktadır.

Buna göre,  $P(0) - R(0)$  değeri kaçtır?

- A) 24      B) 27      C) 30      D) 33      E) 36

15. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir  $P(x)$  polinomu veriliyor.  $m$  ve  $n$  pozitif gerçel sayılar olmak üzere,

$$P(x) - m = 0$$

polinomunun çözüm kümesi bir elemanlıken

$$P(x) - m - 9 = 0$$

polinomunun kökleri  $-n$  ve  $n$  olmaktadır.

$$P(n) = 12$$

olduğuna göre,  $m + n$  toplamı kaçtır?

- A) 6      B) 7      C) 8      D) 9      E) 10



1.  $6x^2 - x - 35 = 0$

İkinci dereceden denkleminin kökleri a ve b'dir.

$$a < 0 < b$$

olduğuna göre,  $3a + 2b$  toplamı kaçtır?


- A) -2    B) -1    C) 0    D) 1    E) 2

2.  $x^2 - 4 \cdot 3^3 \cdot x + 3^7 = 0$

denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $-3^4$     B)  $-3^3$     C)  $3^2$     D)  $3^4$     E)  $3^5$

3. Çarpanlara ayırma konusunda  $ax^2 + bx + c$  biçimindeki ifadeleri çarpanlara ayırırken son hamle olan çarpanları yazma işlemini yanlış anlayan Banu ifadeyi,



birimde çarpanlara ayırmaktadır.

Buna göre,

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

denkleminin köklerinin toplamını bulacak Banu'nun bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç eksiktir?

- A)  $\frac{1}{2}$     B) 1    C)  $\frac{3}{2}$     D) 2    E)  $\frac{5}{2}$

4.  $4x^2 - (m - 2)x + 2m - 40 = 0$

denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre, denklemin büyük kökü kaçtır?

- A) -6    B) -3    C) 2    D) 3    E) 6

5. Köklerinden biri  $3 + 2\sqrt{3}$  olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?


- A)  $x^2 - 6x + 4 = 0$   
B)  $x^2 - 6x - 11 = 0$   
C)  $x^2 + 6x + 4 = 0$   
D)  $x^2 - 6x + 3 = 0$   
E)  $x^2 - 6x - 3 = 0$

6. Aşağıda Venn şemasında;

- Sayıların harf ile yazılışında d harfi ile başlayan sayıların kümesi A,
- Sayıların harf ile yazılışında i harfi ile biten sayıların kümesi B,
- Sayıların harf ile yazılışında 4 harfli rakamlar kümesi C ile gösterilmiştir.

$$x^2 - 6x + m - 1 = 0$$

ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri



boyalı bölgeye ait olduğuna göre, m'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

- A) -42    B) -48    C) -54    D) -56    E) -63

7.  $x^2 - (\sqrt{3} + 2)x + \sqrt{3} - 2 = 0$

denkleminin kökleri  $x_1$  ve  $x_2$ 'dir.

Buna göre,

$$x_1^2 \cdot x_2 + x_2^2 \cdot x_1$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -2      B) -1      C) 0      D) 1      E) 2

8.  $x^2 - 3x - 4 = 0$

ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri aynı zamanda

$$x^2 - (a+2)x + 4 = 0$$

ikinci dereceden denkleminin de köküdür.

Buna göre,  $a$ 'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

- A) -4      B) -3      C) -2      D) -1      E) 0

9.

$P(x) = x^2 - 10x + 40$
$R(x) = x^2 + 2x - 8$
$M(x) = x^2 - 4x + 1$

Bir  $x$  tam sayısının 3 ile bölümünden kalan; 0 ise yeşil, kalan 1 ise mavi ve kalan 2 ise turuncu kutu içerisinde bulunan polinomdaki  $x$  yerine yazılıarak sonuç bulunuyor.

$n$  bir doğal sayı olmak üzere,

$$x = 4 \text{ ve } x = 3n$$

İçin elde edilen sonuçlar aynı olduğuna göre  $n$  kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

10.  $a, b$  ve  $c$  gerçek sayılar olmak üzere,

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ikinci dereceden denkleminin kökleri  $x_1$  ve  $x_2$ 'dir.

- $a - b + c = 0$
- $x_1 + x_2 = 2$

olduğuna göre,  $\frac{c}{a}$  oranı kaçtır?


- A) -4      B) -3      C) -2      D) -1      E) 1

11.  $x^2 + 4x - a = 0$

ikinci dereceden denkleminin gerçek kökü olmadığına göre,  $a$ 'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) -6      B) -5      C) -4      D) -3      E) -2

12. Aşağıda bir otoparkın süreye bağlı olarak belirlediği ücret tarifesi tabelası gösterilmiştir. Tabelanın bazı bölgelerinde boyalı olduğundan 5 - 10 saat ve 10 - 24 saat ücreti okunamamaktadır.



Bu otoparka aynı anda gelen 5 araçtan 2 tanesi 3 saat, 1 tanesi 7 saat ve 2 tanesi 14 saat otoparkta kalıyor ve toplam 61 ₺ ücret ödüyorlar.

10 - 24 saat ücreti 5 - 10 saat ücretinin karesi olduğuna göre, 5 - 10 saat ücreti kaç ₺ dir?

- A) 4      B) 4,5      C) 5      D) 6      E) 7



1.  $i^2 = -1$  olmak üzere,

$$(1 + i^{16}) \cdot (1 - i^{18})$$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -4      B) 4i      C) 2i      D) -4i      E) 4


2.  $\frac{x}{x+1} = \frac{x+2}{3x}$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $\left\{-2, \frac{1}{2}\right\}$       B)  $\left\{-\frac{1}{3}, 2\right\}$       C)  $\{-2, 1\}$   
 D)  $\left\{-\frac{1}{2}, 2\right\}$       E)  $\left\{-\frac{1}{2}, -2\right\}$

3.  $x^2 - 4x + 2 = 0$

ikinci dereceden denklemin kökleri  $r_1$  ve  $r_2$ 'dir.



Merkezleri O noktası olan iki yarımdairenin büyükün yarıçapı  $r_1 + r_2$ , küçükün yarıçapı  $r_1 \cdot r_2$  birimdir.

Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç  $\pi br^2$  dir?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8

4.  $x^2 - ax + a = 0$

ikinci dereceden denkleminin kökleri  $x_1$  ve  $x_2$  dir.

$$x_1 + x_2 + x_1 \cdot x_2 = 10$$

olduğuna göre, a kaçtır?

- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

5.  $x^2 - 2x - 6 = 0$

ikinci dereceden denkleminin kökleri a ve b'dir.


Buna göre,

$$(a - 3) \cdot (a + 1) \cdot (b + 3) \cdot (b - 5)$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -27      B) -24      C) -18      D) -15      E) -12

6. Her sırada arka arkaya sıralanmış araçlardan oluşan bir otoparkta araçlar, kırmızı çizginin solunda 1, 4, 7, ... biçimde aritmetik olarak, sağında 7, 7, 7, ... biçimde sabit sayıda araç sıralanmıştır.



Çizginin solunda oluşan sıra sayısı ile sağında oluşan sıra sayısı aynıdır.

Çizginin solunda bulunan araç sayısı, sağında bulunan araç sayısından 9 fazla olduğuna göre, çizginin solunda bulunan sıra sayısı kaçtır?

- A) 4      B) 5      C) 6      D) 7      E) 8